

予防接種実施医療機関でご相談の上、接種を受けましょう。

5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳	望ましい時期	
満	<ul style="list-style-type: none"> <li>接種開始が生後7か月以上12か月未満の場合は、初回2回、追加1回。</li> <li>接種開始が12か月以上5歳未満の場合は、1回</li> </ul>	生後2か月以上7か月未満 初回終了後、7～13か月の間隔をあけて1回
満	<ul style="list-style-type: none"> <li>接種開始が生後7か月以上12か月未満の場合は、初回2回、追加は12か月齢後に1回。</li> <li>接種開始が生後12か月以上24か月齢未満の場合は、60日以上の間隔をあけて2回。</li> <li>接種開始が2歳以上5歳未満の場合は、1回。</li> </ul>	生後2か月以上7か月未満 初回終了後、60日以上の間隔をあけて、かつ12～15か月齢で1回
		生後2か月～9か月未満
		1回目接種後、139日以上の間隔をあけて1回
未満の間に2回接種。1回目は生後14週6日まで		1回目は生後14週6日までに接種 1回目接種後、27日以上の間隔をあけて2回目接種
未満の間に3回接種。1回目は生後14週6日まで		1回目は生後14週6日までに接種 1回目接種後、27日以上の間隔をあけて2回目接種 2回目接種後、27日以上の間隔をあけて3回目接種
月以上90か月未満	2期：11歳以上13歳未満	生後3か月以上12か月未満
		初回終了後、1年～1年6か月後に1回
		小学校6年生
		生後5か月～8か月未満
未満	2期：5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間	1歳になったらなるべく早く
		5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間 (保育園の年長児に相当する年齢)
月以上36か月未満		生後12か月以上15か月未満
		1回目接種後、6か月～12か月の間隔をあけて1回
	2期：9歳以上13歳未満	3歳
		4歳(1期初回終了後6か月以上の間隔をあけて1回)
		小学4年生

<p style="text-align: center;"><b>不活化ワクチン</b></p> <p>DT(ジフテリア破傷風混合) 子宮頸がん予防 四種混合(百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合) 日本脳炎 ヒブ 小児用肺炎球菌 B型肝炎</p> <p style="text-align: center;">インフルエンザ(任意接種) 生ワクチン(経口) ロタウイルスワクチン</p>
---

いずれも接種間隔に関する規定はなし

→→→→	生ワクチン(注射)
	生ワクチン(経口)
	不活化ワクチン

学前の1年間(3月31日までの)間に接種してください。この期間を過ぎると有料になります。