


予防接種スケジュール

* 四種混合ワクチンおよびヒブワクチンを接種した方は、続きの回数から五種混合ワクチンに変更することはできません。

病気にかかりやすい時期を考慮して定められた期間です。接種が望ましい時期になったら、予防接種実施医療機関でご相談の上、接種を受けましょう。

予防接種の種類	受ける回数	法律などで定められている期間																		望ましい時期		
		6週	2か月	3か月	6か月	9か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳			
ヒブ (インフルエンザ菌b型)	初回：27～56日の間隔を開けて3回		↓	↓	↓			生後2か月以上5歳未満				接種開始が生後7か月以上12か月未満の場合は、初回2回、追加1回。 接種開始が12か月以上5歳未満の場合は、1回。										生後2か月以上7か月未満
	追加：1回																					初回終了後、7～13か月の間隔をあけて1回
小児用肺炎球菌	初回：27日以上の間隔をあけて、かつ12か月齢未満で3回		↓	↓	↓			生後2か月以上5歳未満				接種開始が生後7か月以上12か月未満の場合は、初回2回、追加は12か月齢後に1回。 接種開始が生後12か月以上24か月齢未満の場合は、60日以上の間隔をあけて2回。 接種開始が2歳以上5歳未満の場合は、1回。										生後2か月以上7か月未満
	追加：1回																					初回終了後、60日以上の間隔をあけて、かつ12～15か月齢で1回
B型肝炎	初回：27日以上の間隔をあけて、2回		↓	↓			↓	1歳未満														生後2か月～9か月未満
	追加：1回																					1回目接種後、139日以上の間隔をあけて1回
ロタウイルス (1価または5価のいずれか一方)	1価 2回接種（経口接種） 27日以上の間隔をおいて2回接種		↓	↓			1価の場合は 生後6週以上24週未満の間に2回接種。1回目は生後14週6日まで												1回目は生後14週6日までに接種 1回目接種後、27日以上の間隔をあけて2回目接種			
	5価 3回接種（経口接種） 27日以上の間隔をおいて3回接種		↓	↓	↓		5価の場合は 生後6週以上32週未満の間に3回接種。1回目は生後14週6日まで												1回目は生後14週6日までに接種 1回目接種後、27日以上の間隔をあけて2回目接種 2回目接種後、27日以上の間隔をあけて3回目接種			
R6.4.1～ 五種混合 (百日せき・ジフテリア・ 破傷風・不活化ポリオ・ヒブ混合)	1期初回：20～56日の間隔をあけて3回		↓	↓	↓			1期：生後2か月以上90か月未満										2期：11歳以上13歳未満		生後2か月以上7か月未満		
	1期追加：1回																	↓		初回終了後、6～18か月の間隔をあけて1回		
	2期：2種混合を1回																			小学6年生		
四種混合 (百日せき・ジフテリア・ 破傷風・不活化ポリオ混合)	1期初回：20～56日の間隔をあけて3回		↓	↓	↓			1期：生後2か月以上90か月未満												生後2か月以上12か月未満		
	1期追加：1回																			初回終了後、1年～1年6か月後に1回		
BCG	1回				↓	1歳未満															生後5か月～8か月	
MR (麻しん風しん混合)	1期：1回						1期：生後12か月以上24か月未満					2期：5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間							1歳になったらなるべく早く			
	2期：1回										↓							5歳以上7歳未満で小学校に就学前の1年間 (保育園の年長児に該当する年齢)				
水痘	2回：3か月以上の間隔をあけて2回						↓	↓	生後12か月以上36か月未満										生後12か月以上15か月未満 1回目接種後、6～12か月の間隔をあけて1回			
						1期：生後6か月以上90か月未満			↓	↓	↓	2期：9歳以上13歳未満							3歳			
日本脳炎	1期初回：6～28日の間隔をあけて2回																		4歳（1期初回終了後6か月以上の間隔をあけて1回）			
	1期追加：1回															↓						
	2期：1回																		小学4年生			

(注1) 異なった種類ワクチンを接種する場合の間隔



不活化ワクチン	
DT（ジフテリア・破傷風混合）	子宮頸がん予防
四種混合（百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合）	
五種混合（百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ混合）	
日本脳炎	ヒブ 小児用肺炎球菌 B型肝炎
インフルエンザ（任意接種）	
生ワクチン（経口）	
ロタウイルスワクチン	

いずれも接種間隔に関する規定はなし

生ワクチン（注射）
生ワクチン（経口）
不活化ワクチン

(注2) ジフテリア・破傷風（DT）二種混合2期、日本脳炎2期は接種時期に案内文と予診票を送付します。

(注3) BCGは生後12か月未満、MR（麻しん・風しん混合）1期は、1歳以上2歳未満、MR2期は小学校就学前の1年間（3月31日まで）の間に接種してください。この期間を過ぎると有料になります。

問い合わせ▶ 健康ほけん課 ☎82-3785